




Vliegend hert gezien? Stuur een mail naar eis@ncbnaturalis.nl

start!



Vliegend hert *Lucanus cervus*, man. Nederlands grootste en spectaculairste kever, onmiskenbaar, beschermd en op een beperkt aantal plaatsen voorkomend (z.o.z).




Gewone meikever *Melolontha melolontha*
Berucht door de schadelijke larven (engerlingen)



Zandmeikever *Melolontha hippocastani*
Zeldzamer dan 2. Op zandgronden, vooral duinen




Geelgerande waterroofkever *Dytiscus* sp. (NL: 7 soorten) of **Tuimelaar** *Cybister lateralmarginalis*



Spinnende watertor *Hydrophilus piceus*. Mannetjes hebben driehoekjes aan voorpoot



Julikever *Polyphylla fulva*. Een grote soort. Vooral op de zandgronden en in de duinen.



Neushoornkever *Oryctes nasicornis*, man
Zeer opvallend en wijdverbreid, maar door ->



Neushoornkever *Oryctes nasicornis*, vrouw
verborgen levenswijze weinig waargenomen



Mestkevers *Geotrupes* spec. (NL: 6 soorten). Vooral algemeen op de zandgronden



Driehoornmestkever *Typhaeus typhoeus*
Onmiskenbaar. Lokaal op de zandgronden

Vliegende herten gezocht!

De grootste en spectaculairste kever van Nederland wordt gezocht! Om de soort beter te kunnen beschermen is het noodzakelijk te weten waar deze precies voorkomt. Het mannetje is onmiskenbaar door zijn grootte en formidabele geweevormige kaken. Het vrouwtje is echter minder makkelijk herkenbaar. De afgelopen jaren is gebleken dat verschillende andere keversoorten vanwege hun grootte geregeld worden aangezien voor vliegende herten. Meestal worden de dieren als vrouwtjes bestempeld vanwege het ontbreken van de markante kaken. Met deze zoekkaart wordt een handreiking gegeven om tot een juiste determinatie te komen aan de hand van enkele gerichte vragen en eenvoudige kenmerken.

Voorkomen

Het vliegend hert komt nog in vijf verspreid liggende gebieden voor. Drie daarvan betreffen relatief kleine gebieden op de grens met Duitsland. Op de Veluwe komt de soort met name voor ten noorden van de snelweg A1. In Zuid-Limburg komt hij met name voor ten zuidoosten van de lijn Geleen-Maastricht. De larven zijn afhankelijk van dood (eiken)hout waardoor de dieren gebonden zijn aan bossen (met name de randen) en houtwallen. De volwassen dieren zijn vooral op zwoele zomeravonden actief en zijn dan vliegend waar te nemen. Overdag zitten ze veelal weggekropen in de boomkruin. Een enkele keer zijn de dieren op stammen van eiken te vinden, met name op bloedende wonden. De volwassen dieren drinken van dit vocht. Het vliegend hert is actief van begin juni tot eind augustus.

Waarnemingen doorgeven

We roepen iedereen op waarnemingen door te geven het liefst voorzien van een foto. Ook waarnemingen van andere kevers kunnen doorgegeven worden. De gegevens die we graag ontvangen zijn **1)** de soort, **2)** mannetje of vrouwtje, **3)** het aantal individuen, **4)** de datum en **5)** een zo nauwkeurig aangegeven vindplaats, het liefst voorzien van coördinaten. Waarnemingen kunnen gestuurd worden naar eis@ncbnaturalis.nl

Meer informatie is te vinden op www.naturalis.nl/vliegendhert



Colofon

Zoekkaart grote kevers. © Stichting EIS 2010

Uitgave

EIS-Nederland
Postbus 9517
2300 RA Leiden
eis@ncbnaturalis.nl


Tekst: J.T. Smit

Opmaak: B. Koese


Fotografie: W. van de Broek (6), M. van Dijk (12), J. Hoek (13), R. Kleukers (3, 9), B. Koese (4, 5), G. Kramer (10), W. Slegers (8), J.T. Smit (1, 2), R. Versteeg (11), M. Welzen (14), H. van Woerden (7, 15).

*Deze kaart werd mogelijk gemaakt door het programma **Capacity Building** van de stichting VeldOnderzoek Flora en Fauna (VOFF), gefinancierd door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).*

vervolg ommezijde




Lederboktor *Prionus coriarius*. Vrij zeldzaam, vooral in de schemer en nacht actief



Wortelboktor *Spondylis buprestoides*. Vrij algemeen op de zandgronden



Blauw vliegend hert *Platycerus caraboides*. Vrij algemeen op zandgronden en in Zuid-Limburg



Klein vliegend hert *Dorcus parallelipedus*. Kleine broertje van 15. Matzwart. In Limburg



Vliegend hert *Lucanus cervus*, vrouw. Door kastanjebruine dekschilden, duidelijke kaken goed te onderscheiden van andere kevers.